



Консультации по вопросам применения  
и приобретения препаратов:

+7 499 110 -14 - 35  
127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, корп. 15

[info@miralek.vet](mailto:info@miralek.vet)  
[www.miralek.vet](http://www.miralek.vet)

**КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ  
ПТИЦЕВОДСТВА**

НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМА ВЫПУСКА	СОСТАВ	ПОКАЗАНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
<b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b>				
<b>Амоксим 80%</b>	порошок	Амоксициллин тригидрат, 800 мг	Колибактериоз, сальмонеллез и др. инфекции желудочно-кишечного, респираторного, мочеполового тракта	10-25 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в течение 5-7 дней
<b>Метронидазол</b>	таблетки	Метронидазол, 0,5 гр	Гистомоноз гусей и уток	10 мг /1 кг массы тела 3 раза в день в течение 10 дней  3 таблетки на 1 кг корма 1 раз в день в течение 10 дней
<b>Метрофуросин</b>	порошок	Метронидазол, 0,11 гр Окситетрациклина гидрохлорид, 0,025 гр Фуразолидон, 0,01 гр	Респираторный микоплазмоз кур, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы	1,5-2 кг на 1 т корма в течение 5-7 дней
<b>Доксициклин П-500</b>	порошок	Доксициклин, 500 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей	200-400 гр на 1000 л воды в течение 3-5 дней
<b>Энроколистин</b>	раствор	Энрофлоксацин, 100 мг Колистин сульфат, 50 мг	Колибактериоз, сальмонеллез, псевдомоноз, пастереллез, микоплазмоз, инфекционный ринит, стафилококкоз	0,1 см <sup>3</sup> /кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
<b>Доливет</b>	раствор	Доксициклин, 100 мг Линкомицин, 100 мг	Колибактериоз, сальмонеллез, клостридиоз, пастереллез, микоплазмоз	1 мл/л в течение 3-5 дней
<b>Тиафарм</b>	порошок	Тиамулин гидрогенфумарат, 450 мг	Микоплазменные инфекции	50 гр/100 л воды в течение 3 дней
<b>Доксик 10%</b>	раствор	Доксициклин гиклат, 100 мг	Колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, микоплазмоз, хламидиоз, диарея, стафилококкоз	0,5-1,0 мл/1 л воды в течение 3-5 дней
<b>Колистин-240</b>	раствор	Колистин 240, млн.МЕ	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей	0,5 мл/1 л воды в течение 3-4 дней.
<b>Гентафарм 10%</b>	порошок	Гентамицина сульфат, 100 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта	5 гр/100 л воды в течение 5-7 дней
<b>Окситетравет 20%</b>	порошок	Окситетрациклина гидрохлорид, 200 мг	Колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, стафилококковая инфекции, риккетсиоз, актиномикоз	100-250 мг/кг массы тела 2 раза в сутки в течение 3-5 дней
<b>Энроцин 10%</b>	порошок	Энрофлоксацин, 100 мг	Колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, гемофилез, кампилобактериоз, атрофический ринит, микоплазмоз, хламидиоз, стафилококковая инфекция, инфицированные раны	1 кг/1 т корма 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
<b>Энроцин 20%</b>	порошок	Энрофлоксацин, 200 мг		0,5 кг/1 т корма 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
<b>Энроцин-С 10%</b>	раствор	Энрофлоксацин, 100 мг		5 мл/10 л воды в течение 3-5 дней

<b>Тилоцин 800 ME</b>	порошок	Тилозин тартрат, 800 ME	Респираторный микоплазмоз кур, инфекционный синусит индек	0,65 гр/1 л воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания
<b>Тилоцин 500 ME</b>	порошок	Тилозин тартрат, 500 ME		1 гр/1 л воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания
<b>Норвет 20%</b>	порошок	Норфлоксацин, 200 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовых путей	12,5-25 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течении 3-5 дней
<b>Норвет 10%</b>	порошок	Норфлоксацин, 100 мг		25-50 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
<b>Биовит</b>	порошок	Комплексный препарат, содержащий хлортетрациклина гидрохлорид, витамины E и B12, соединения цинка и селена	Пастереллез, сальмонеллез, колибактериоз, лептоспироз, листериоз, некробактериоз, пневмоэнтерит бактериальной этиологии	0,60 - 0,65 гр/1 кг массы тела
<b>Амоксициллин 115</b>	порошок	Амоксициллина тригидрат, 115 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания	100 гр/50 л воды 2 раза в сутки в течение 3-5 дней
<b>Энротим 10%</b>	раствор	Энрофлоксацин, 100 мг	Бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания	0,05 мл/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
<b>Энротим 10%</b>	порошок			30-50 мг/1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3-5 дней
<b>Линкоспек</b>	порошок	Линкомицин, 220 мг Спектомицин, 440 мг	Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания	0,75 гр/1 л воды 1 раз в сутки в течение 5-7 суток.

#### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

<b>Аванте</b>	фл 4 гр	Цефтиофул, 4,0 гр	Контроль раннего падежа цыплят, связанного с Escherichia coli, Salmonella spp. и другими микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру натрия	0,08-0,2 мг на голову подкожно в области шеи
---------------	---------	-------------------	--	--

#### ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

<b>Альбовет</b>	порошок	Альбендазол, 0,1 гр	Нематодоз, цестодоз, трематодоз	0,5 гр/10 кг массы тела однократно
<b>Альбендатим 10%</b>	гранулированный порошок	Альбендазол, 0,1 гр	Аскаридоз, гетеракидоз	100 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течении 2 дней
<b>Альбендатим 20%</b>	гранулированный порошок	Альбендазол, 0,2 гр	Аскаридоз, гетеракидоз	50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 2 дней
<b>Левамизол г/х 7,5%</b>	100 мл	Левамизол гидрохлорид, 75 мг	Аскаридоз, гетеракидоз, капилляриоз, гангулетеракидоз, тетрамероз, амидо-стомоз, сингамоз	1 мл/2,5 кг массы тела однократно внутрь с водой
<b>Тимбендазол 22%</b>	гранулированный порошок	Фенбендазол, 0,22 гр	Аскаридоз, гетеракидоз, амидостомоз, гангулетеракидоз	23-45 мг/кг массы тела однократно групповым методом

#### КОКЦИДИОСТАТИКИ

<b>Ампронетфарм</b>	порошок	Ампролиум гидрохлорид, 0,3 гр	Эймериоз	800 гр/1 т воды в течение 5-7 дней
<b>Ампронетфарм С</b>	раствор	Ампролиум гидрохлорид, 300 мг		800 мл/1 т воды в течение 5-7 дней