ОДОБРЕНО
Совет по ветеринарным препаратам
протокол от «17» марта 2023 г. № 127

Инструкция по применению ветеринарного препарата «Шампунь антибактериальный СкинВет Трис-Хлор»

1 Общие сведения

1.1 Шампунь антибактериальный СкинВет Трис-Хлор (Shampoo antibacterial SkinVet Tris-Chlor).
Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: хлоргексидин.
Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

1.2 Ветеринарный препарат «Шампунь антибактериальный СкинВет Трис-Хлор» (далее по тексту – препарат) по внешнему виду представляет собой густой прозрачный раствор от бесцветного до бежевого цвета.

1.3 В качестве действующего вещества в 1,0 мл препарат содержит 40 мг хлоргексидина биглюконата, а также вспомогательные вещества: воду очищенную, кокоамидопропил бетаин, метилкокоилтаурат натрия, кокоглюкозид, глицерин, трометамин основание, трометамин гидрохлорид, динатрия эдетат, спирт бензиловый.

1.4 Препарат выпускают в полимерных флаконах по 50, 100, 150, 200, 250, 500 и 1000 мл, укупоренных крышками флип-топ, диск-топ или дозаторами.

1.5 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С в сухом, защищенном от света месте отдельно от продуктов питания и кормов. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

1.6 Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения; после вскрытия флакона при условии соблюдения указанных условий хранения – 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности.

1.7 Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

2 Фармакологические свойства

2.1 Хлоргексидин, входящий в состав препарата, является хлорсодержащим производным бигуанидина, оказывает противомикробное, противогрибковое и вирулицидное действие, активен в отношении грамотрицательных и грамположительных аэробных и анаэробных бактерий (Klebsiella spp., Salmonella spp., E. coli, Proteus spp., Staphylococcus spp., в том числе и против Staphylococcus aureus MRSA, Streptococcus spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., Corynebacterium spp., Campylobacter fetus, Enterobacter spp., Pseudomonas spp.). Активен также в отношении грибков рода Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, а также дрожжеподобных грибков Candida, Malassezia.

2.2 Механизм действия хлоргексидина основан на взаимодействии с фосфатными группами на поверхности микробной клетки, при этом липофильные группы хлоргексидина способствуют дезагрегации липопротеиновой мембраны бактерий, нарушая тем самым осмотическое равновесие бактериальной клетки, выход из них калия и фосфора, что ведет к гибели микроорганизма. Как и другие катионактивные соединения, хлоргексидин при наружном применении остается на коже, проявляя пролонгированное защитное действие.

2.3 Препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия.

3 Порядок применения

3.1 Препарат назначают собакам и кошкам в качестве лечебно-профилактического антисептического и противогрибкового средства при заболеваниях кожи, вызванных бактериальной или грибковой микрофлорой,

в частности, при поверхностной и глубокой пиодермии, дерматофитозах, малассезиозах, себорейных заболеваниях, дерматитах аллергической этиологии, малассезиозном дерматите, смешанных микробных дерматитах, дерматофитии и других поражениях кожи, осложненных бактериальной и/или грибковой инфекцией. Препарат применяют также в целях профилактики инфицирования мелких ран, ссадин, царапин, трещин на коже у животных после стрижки, бритья, тримминга, а также для гигиенического ухода за кожно-шерстяным покровом животных (глубокое очищение, устранение неприятного запаха животного и др.).

3.2 Препарат применяют наружно путем равномерного нанесения на смоченную теплой водой шерсть животного. В зависимости от величины, длины и густоты шерстного покрова препарат наносят из расчета от 1,0 до 3,0 мл на 1 кг веса и втирают массирующими движениями до образования пены.

3.3 Следует избегать попадания препарата в глаза, уши, пасть и предотвращать слизывание его животными. Через 5–10 минут препарат тщательно смыть теплой водой, шерсть высушить и расчесать. В зависимости от патологии, рекомендуется применять препарат каждые 3–5 дней в течение 3–4 недель или по назначению врача. Для профилактики препарат применяют каждые 1–2 недели.

3.4 При использовании препарата согласно инструкции по применению побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций использование препарата прекращают, при необходимости назначают животному средства симптоматической терапии.

3.5 Сведений о несовместимости компонентов препарата с другими средствами фармакологических групп отсутствуют.

3.6 Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом должны выполняться общие требования по технике безопасности и личной гигиене. Не допускается применение препарата внутрь и введение в полости. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Федеральное Казенное Предприятие «Армавирская биофабрика», Российская Федерация, 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11 для ООО «МИРАЛЕК-ФАРМА», Российская Федерация, 107014, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, ул. Стромынка, д. 4 к. 1, ком. 7.

Инструкцию по применению препарата подготовили сотрудники Минского филиала УП «Научно-исследовательский институт БиоФарм» (А.Э. Высоцкий) и ООО «МИРАЛЕК-ФАРМА» (С.Н. Жерлицын).